

هالوپریدول:

در بیماریهایی مانند ، اسکیزوفرنی ، اختلال دو قطبی و تیک مورد استفاده قرار می گیرد. این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی موثر میباشد و نباید زودتر از موعد مقرر و بدون نظر پزشک قطع شود. هالوپریدول به صورت قرص و آمپول و قطره در دسترس می باشد. از نوع تزریقی آن در مواقع تحریک پذیری شدید استفاده می شود. هالوپریدول مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک و جدی نیستند. روانپزشک زمانی این دارو را تجویز میکند که منافع آنها بسیار بیشتر از عوارضش باشد. عوارض جانبی تغییرات فیزیولوژیک ماندگار و دائمی نیستند بلکه بعلت حضور فعال ماده در بدن ایجاد شده ، موقتی بوده و نشان دهنده تاثیر دارو نیز می باشد. بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.


برخی از عوارض جانبی هالوپریدول:

- ممکن است در برخی از افراد اشکال در بلع ایجاد شود.
- در بعضی بیماران انقباض و گرفتگی عضلات که به صورت کج شدن گردن و ستون فقرات است بروز میکند.
- اشکال در صحبت کردن ، کشیدن پا به زمین هنگام راه رفتن و سختی عضلات ساق پا و بازوها ممکن است بوجود بیاید.
- احتباس ادرار و مدفوع ، تاری دید ، افزایش وزن ، خواب آلودگی ، واکنش های حساسیتی پوستی ، یبوست و کاهش میل جنسی نیز از عوارض احتمالی دارو می باشد.

تداخل هالوپریدول با سایر داروها:

مصرف بعضی از داروها به همراه هالوپریدول باعث کاهش یا افزایش اثر دارو می شود، لذا

لازم است قبل از مصرف هر گونه دارو با پزشک مشورت کنید. مصرف همزمان هالوپریدول با الکل ، برخی داروهای ضد درد ، داروهای مخدر و آرام بخشها موجب خواب آلودگی بیش از حد تنفس نامناسب و افت فشار خون می شود.



نکات قابل توجه در مصرف دارو:

- این دارو باید با نظر پزشک مصرف شود از افزایش یا کاهش و یا قطع آن بدون نظر پزشک خودداری شود.
- دارو میتواند همراه با غذا و یا با معده خالی و یک لیوان آب میل شود، در صورت بروز مشکلات گوارشی بهتر است همراه غذا مصرف شود.



بیمارستان روانپزشکی دل آرام



راهنمای مصرف هالوپریدول

تلفن بیمارستان : ۰۲۱-۵۵۱۸۰۸۹۰

سوپروایزر آموزش سلامت

➤ در صورت بارداری، قبل از مصرف دارو، باردار بودن خود را به پزشک اطلاع دهید.

➤ در زمان شیردهی، قبل از مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید.

➤ دوره درمان را کامل کنید. برای رسیدن به اثرات درمانی مناسب ممکن است هفته ها زمان لازم باشد.

منبع: وزارت بهداشت، معاونت غذا دارو (۱۳۸۹)

(دارونامه رسمی ایران-تهران، نشر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اد

➤ هنگام رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارد، احتیاط کنید زیرا با مصرف دارو امکان بروز خواب آلودگی وجود دارد.

➤ از تماس محلولهای خوراکی هالوپریدول با پوست جلوگیری نمایید زیرا می تواند باعث واکنش های پوستی شود.

➤ از قرار گرفتن بیش از حد در برابر آفتاب خودداری کنید و از لوسیونهای محافظ نور خورشید، عینک آفتابی و پوشش کامل استفاده کنید.

➤ کم شدن بزاق به خصوص در بیماران سالخورده باعث خشکی دهان، پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه و دهان می شود، بنابراین حفظ بهداشت دهان و مسواک زدن و خلال دندان توصیه میشود.

➤ برای کاهش یبوست ناشی از دارو، مقدار کافی مایعات، میوه و سبزی مصرف نمایید و تحرک و فعالیتهای ورزشی خود را افزایش دهید.

➤ در صورت فراموش کردن یک دوز دارو را از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری کنید.