

کاربامازپین

دارویی است که در درمان تشنج و اختلالات خلقی کاربرد دارد. برخی این دارو را با نام تگرتول می شناسند. استفاده از این دارو در کوتاه نمودن دوره بیماری و کم کردن علائم و جلوگیری از حملات بعدی موثر میباشد و نباید زودتر از موعد مقرر و بدون نظر پزشک قطع شود.

کاربامازپین به شکل قرص های ۲۰۰ و ۴۰۰ میلی گرمی و شربت موجود میباشد. کاربامازپین مانند بسیاری از داروهای دیگر علاوه بر مزایای درمانی ممکن است عوارضی هم داشته باشد که این عوارض همیشه و در تمامی افراد ظاهر نمی شود و اگر هم بروز پیدا کند همیشه خطرناک و جدی نیستند. روانپزشک زمانی این دارو را تجویز می کند که منافع آنها بیشتر از عوارضش باشد. عوارض جانبی تغییرات ماندگار و دائمی نیستند بلکه بعلت حضور فعال ماده در بدن ایجاد شده، موقتی بوده و نشان دهنده تاثیر دارو نیز می باشد. بسیاری از عوارض دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطع دارو نیست و در اولین فرصت باید با پزشک مشورت شود.

برخی از عوارض جانبی کاربامازپین:

یبوست، سرگیجه یا خواب آلودگی، گیجی، دو بینی، تهوع، استفراغ، سردرد، مشکل در به خواب رفتن، خشکی دهان و افزایش حساسیت به نور خورشید، از عوارض جانبی دارو می باشد.

*جهت کاهش خشکی دهان میتوان از آدامس و آبنبات بدون قند استفاده نمود.

* به منظور کاهش پوسیدگی دندانها، باید بهداشت دهان و دندان به طور مناسب رعایت شود.

توجه در صورت بروز هر یک از موارد زیر باید سریعا به پزشک مراجعه کنید:

خونریزی غیر معمول، یرقان، تیره شدن رنگ ادرار، مدفوع کم رنگ، درد شکمی، تب لرز، گلو درد، کبود شدن بی دلیل پوست و زخم دهان اختلال در هوشیاری و تعادل.

تداخل کاربامازپین با سایر داروها

مصرف بعضی از داروها به همراه کاربامازپین باعث تغییرات اثرات دارو می شود که می تواند خطرناک نیز باشد. لذا لازم است قبل از مصرف هر گونه دارو با پزشک مشورت کنید و تاریخچه مصرف دارویی خود را به طور کامل به اطلاع پزشک برسانید.

لطفا" به موارد زیر توجه نمایید:

➤ مصرف همزمان دارو با داروهای ضد بارداری باعث کاهش اثر داروی ضد بارداری می شود.

➤ در مصرف همزمان با سایمتیدین، اثر دارویی کاربامازپین بیشتر میشود و منجر به مسمومیت با کاربامازپین می شود.

➤ در مصرف همزمان با الکل و خواب آورها، باعث افزایش اثر الکل و خواب آورها میشود.

➤ مصرف همزمان با والپروات سدیم یا اسید والپروئیک بایستی با احتیاط و زیر نظر پزشک مصرف شود.





بیمارستان روانپزشکی دل آرام



راهنمای مصرف کاربامازپین

تلفن بیمارستان : ۰۲۱-۵۵۱۸۰۸۹۰

سوپروایزر آموزش سلامت

آفتابی و پوشش کامل استفاده کنید.
*در صورت داشتن مشکلات کبدی و کلیوی قبل از مصرف دارو به پزشک اطلاع دهید.
*در صورت فراموش کردن یک دوز دارو، از دو برابر کردن دوز بعدی خودداری نمایید.
*در صورت بارداری و تمایل به بارداری قبل از مصرف دارو به پزشک خود اطلاع دهید.
*از آنجائیکه کاربامازپین در شیر مادر ترشح میشود لازم است در صورت شیردهی، قبل از مصرف دارو پزشک خود را مطلع کنید
منبع:

دارونامه رسمی ایران/مولف وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی معاونت غذایی و دارویی/انتشارات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

اد

نکات قابل توجه در مصرف دارو

*دارو را در جای خشک و خنک نگهداری کنید.
*برای جلوگیری از اختلالات گوارشی، دارو را همراه با غذا و در فواصل زمانی مساوی مصرف کنید.
*مصرف دارو را به طور ناگهانی قطع نکنید.
*مصرف این دارو ممکن است موجب خواب آلودگی، سرگیجه و تاری دید شود. در هفته اول درمان و در موارد افزایش مقدار مصرف، از انجام فعالیتهایی که نیاز به هوشیاری دارند خودداری کنید.
*در زمان مصرف دارو به طور منظم به پزشکتان مراجعه کنید تا بتواند بهبودیتان را زیر نظر داشته باشد، ممکن است لازم باشد برای تعیین سطح دارو و جلوگیری از مسمومیت آزمایش بدهید.
*از مصرف الکل و گریپ فروت در دوره درمان با کاربامازپین خودداری نمایید.
*این دارو میتواند باعث افزایش حساسیت به نور شود در دوره درمان از قرار گرفتن طولانی مدت در برابر نور خورشید خودداری نمایید و از کرم ضد آفتاب، عینک.